レジメンNO	bc_adj_EC_75_600	レジメン名	乳癌術後補助療法 EC75・600療法(3週毎)				
癌種別	乳癌	診療科	乳腺外科	コース日数	21日	コース数	標準[4]　最小[-]　最大[6]

処方ｵｰﾀﾞ　注射ｵｰﾀﾞ　表示順変更

NO	種別	内容	数量	単位	開始	時間	0	1W							2W							3W						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	処方	抗がん剤投与1時間前に内服			00:00	-		○																				
		(day1)125mgアプレピタントカプセル「NK」(先:イメンド)	1	カプセル																								
		適時に	1	回分																								
2	注射	メインルートフラッシュ用			00:00	-		○																				
		【ｼﾘﾝｼﾞ】生食注シリンジ「オーツカ」20mL	1	筒																								
		主管A																										
		点滴注射	1	回																								
3	注射	ルート確保			00:00	-		○																				
		生理食塩液バッグ「フソー」 250mL	1	袋																								
		主管A																										
		点滴注射	1	回																								
4	注射	ﾃﾞｷｻｰﾄﾞ注射液3.3mg/1mL(先:ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注)	3	管	00:00	30分		○																				
		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注【ﾊﾞｯｸﾞ】3mg/50mL(先:ｶｲﾄﾘﾙﾊﾞｯ...	1	袋																								
		側管A																										
		30分かけて																										
		点滴注射	1	回																								
5	注射	総量100mLとなるように生食を減量して調製			00:30	20分		○																				
		生理食塩液PL「フソー」 100mL	1	瓶																								
		(癌)エピルビシン塩酸塩注射液	75	mg/m2																								
		側管A																										
		20分かけて																										
		点滴注射	1	回																								
6	注射	生理食塩液PL「フソー」 100mL	1	瓶	00:50	30分		○																				
		(癌)注射用エンドキサン	600	mg/m2																								
		側管A																										
		30分かけて																										
		点滴注射	1	回																								
7	注射	【ｼﾘﾝｼﾞ】生食注シリンジ「オーツカ」20mL	1	筒	01:35	-		○																				
		主管A																										
		点滴注射	1	回																								
8	処方	吐き気が無ければ適宜減量中止可			01:35	-		○																				
		(制吐)メトクロプラミド錠5mg「ﾀｶﾀ」(先:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ)	6	錠																								
		分3(毎食前)	5	日分																								
9	処方	(4mg)デカドロン錠	2	錠	01:35	-		○																				
		分2(朝食前・昼食前) 治療翌日より内服開始	3	日分																								
10	処方	(day2,3)アプレピタントカプセル80mg「NK」(先:イメンド)	1	カプセル	00:00	-		○																				
		分1(朝食前) 治療翌日より内服開始	2	日分																								