

レジメン情報

NO	111016	診療科	外科	有効期限	
名称	SIRB療法	コース日数	21		
癌腫	大腸癌	コース数	標準	—	最大 —

レジメンカレンダー

【注射】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp.1	点滴静注																					
	ベパシズマブ注 7.5mg/kg																					
	生理食塩液 100mL	○																				
	主管A 90分																					
	忍容性が良好であれば60分～30分まで短縮可																					
Rp.2	点滴静注																					
	生理食塩液 250mL	○																				
	主管A ルート確保																					
Rp.3	点滴静注																					
	パロノセトロン注バッグ 0.75mg																					
	デキサート注 9.9mg	○																				
	側管A 30分																					
Rp.4	点滴静注																					
	イリノテカン注 150mg/m ²																					
	生理食塩液 500mL	○																				
	側管A 90分																					
【処方】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp.1	デカドロン錠 8mg		○	○																		
Rp.2	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠 ※下表参照	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	(day1夕からday15朝)					

表)テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠の投与量

体表面積	初回基準量（テガフル相当量）
1.25m ² 未満	40mg/回を1日2回 朝夕食後
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満	50mg/回を1日2回 朝夕食後
1.5m ² 以上	60mg/回を1日2回 朝夕食後

腎機能（クレアチニンクリアランス）を考慮した上で投与量を調節