

レジメン情報

NO	111083	診療科	外科	有効期限		
名称	D-FLOT療法	コース日数	28	術前 2 コース、術後 2 コース		
癌腫	胃癌	コース数	標準	4	最大	4

レジメンカレンダー

1-4コース（術前2コース・術後2コース）																											
【注射】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	...	28			
Rp.1	点滴静注																										
	生理食塩液 100mL	○														○											
	主管A ルート確保																										
Rp.2	点滴静注																										
	デュルバルマブ 1500mg																										
	生理食塩液 100mL	○																									
	体重30kg以下の場合は20mg/kg																										
	側管A 60分																										
	インラインフィルター使用																										
Rp.3	点滴静注																										
	生理食塩液 50mL	○																									
	側管A																										
Rp.4	点滴静注																										
	パロノセトロン注バッグ 0.75mg																										
	アロカリス注 235mg	○															○										
	デキサート注 3.3mg																										
	側管A 30分																										
Rp.5	点滴静注																										
	ドセタキセル 50mg/m ²	○															○										
	生理食塩液 250mL																										
	側管A 60分																										
Rp.6	点滴静注																										
	オキサリプラチン注 85mg/m ²																										
	5%ブドウ糖液 500mL	○															○										
	側管B 120分																										
	レボホリナートと同時に投与																										
Rp.7	点滴静注																										
	レボホリナート注 100mg/m ²																										
	5%ブドウ糖液 250mL	○															○										
	主管A 60分																										
	オキサリプラチンと同時に開始																										
Rp.8	点滴静注																										
	5-FU注 2600mg/m ²																										
	生理食塩液 250mL	○															○										
	24時間																										
	インフューザーポンプ使用時は生食の量を調整																										
【処方】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	...	28			
Rp.1	オランザピン※ 5mg	○	○	○	○											○	○	○	○								

※患者個々の状態に応じて検討。糖尿病及び既往がある場合は禁忌

FN高リスク群（65歳以上、がん薬物療法歴、放射線治療歴、最近の手術歴、肝機能障害、腎機能障害、腫瘍の骨髄浸潤、持続する好中球減少症）はG-CSFの1次予防的投与を検討する。FN発症率：12.5%。