

レジメン情報

NO	111069-111070	診療科	外科	有効期限	
名称	Zolbetuximab+CapeOX療法	コース日数	21		
癌種	胃癌	コース数	標準	－	最大 ー

レジメンカレンダー

【注射】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rp.1	点滴静注																						
	生理食塩液 250mL	○																					
	主管A ルート確保																						
Rp.2	点滴静注																						
	パロノセトロン注バッグ 0.75mg	○																					
	デキサート注 9.9mg																						
	アロカリス注 235mg																						
	ポララミン注 5mg																						
側管A 30分																							
Rp.3	ゾルベツキシマブ 初回:800mg/m ² 2回目以降:600mg/m ²	○																					
	注射用水 1V5mLで溶解																						
	生理食塩液 適量																						
	体表面積は小数点以下第2位を四捨五入																						
	別表を元に生食の量を調整																						
	側管A フィルター付ルート																						
	調製後6時間以内に投与終了すること 投与時間は別紙を参照すること																						
Rp.4	点滴静注	○																					
	オキサリプラチン注 130mg/m ² (GLOW試験では最大8回投与)																						
	5%ブドウ糖液 500mL																						
	側管B 120分																						
【処方】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rp.1	デカドロン錠 4mg		○	○																			
Rp.2	カベシタピン錠 2000mg/m ²	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	(da1夕からday15朝)						

<注意事項>

点滴開始後60分と速度UP時は嘔吐が出現しやすいため注意すること。

嘔吐出現時は直ちに投与を中断し、15-30分経過後も改善が見られない場合はメトクロプラミド1A投与する。

症状が改善したら1段階速度を落として投与再開する。

別表) Zolbetuximab+CapeOX療法 ビロイ調製・投与速度表

ビロイ点滴濃度換算表 (初回: 800mg/m²) 2時間以上かけて投与

体表面積(m ²)	ビロイ投与量(mg)	点滴液量(mL)	投与速度(mL/h)				ビロイ投与時間(h)
			0-60分 100mg/m ² /h	60-120分 200mg/m ² /h	120-180 300mg/m ² /h	180分- 400mg/m ² /h	
1.0	800	400	50	100	150	200	約3.5
1.1	880	440					
1.2	960	480					
1.3	1040	520	65	130	195	260	
1.4	1120	560					
1.5	1200	600					
1.6	1280	640	80	160	240	320	
1.7	1360	680					
1.8	1440	720					
1.9	1520	760	95	190	285	380	
2.0	1600	800					

ビロイ点滴濃度換算表 (2回目以降: 600mg/m²) 2時間以上かけて投与

体表面積(m ²)	ビロイ投与量(mg)	点滴液量(mL)	投与速度(mL/h)			ビロイ投与時間(h)	②から開始した場合のビロイ投与時間(h)
			①0-60分 75mg/m ² /h	②60-120分 150mg/m ² /h	③120分- 300mg/m ² /h		
1.0	600	300	38	75	150	約3.2	約2.5
1.1	660	330					
1.2	720	360					
1.3	780	390	49	98	195		
1.4	840	420					
1.5	900	450					
1.6	960	480	60	120	240		
1.7	1020	510					
1.8	1080	540					
1.9	1140	570	71	143	285		
2.0	1200	600					

※初回嘔気・嘔吐がなければ②から開始可