

レジメン情報

NO	111071-111072	診療科	外科	有効期限	
名称	Zolbetuximab+mFOLFOX療法	コース日数	14		
癌種	胃癌	コース数	標準	—	最大 —

レジメンカレンダー

【注射】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp.1	点滴静注														
	生理食塩液 250mL	○													
	主管A ルート確保														
Rp.2	点滴静注														
	パロノセトロン注バッグ 0.75mg	○													
	デキサート注 9.9mg														
	アロカリス注 235mg														
	ポララミン注 5mg														
	側管A 30分														
Rp.3	ゾルベツキシマブ 初回:800mg/m ² 2回目以降:400mg/m ²	○													
	注射用水 1V5mLで溶解														
	生理食塩液 適量														
	体表面積は小数点以下第2位を四捨五入														
	別表を元に生食の量を調整														
	側管A フィルター付ルート														
	調製後6時間以内に投与終了すること														
	投与時間は別紙を参照すること														
Rp.4	点滴静注	○													
	オキサリプラチン注 85mg/m ² (SPOTLIGHT試験では最大12回投与)														
	5%ブドウ糖液 500mL														
	側管B 120分														
	レボホリナートと同時投与														
Rp.5	点滴静注	○													
	レボホリナート注 200mg/m ²														
	5%ブドウ糖液 250mL														
	主管A 120分 オキサリプラチンと同時投与														
Rp.6	点滴静注	○													
	5-FU注 400mg/m ²														
	5%ブドウ糖液 100mL 主管A 15分														
Rp.7	点滴静注	○													
	5-FU注 2400mg/m ²														
	生理食塩液 100mL 46時間 持続ポンプ使用														
【処方】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp.1	デカドロン錠 4mg		○	○											

<注意事項>

点滴開始後60分と速度UP時は嘔吐が出現しやすいため注意すること。
嘔吐出現時は直ちに投与を中断し、15-30分経過後も改善が見られない場合はメトクロプラミド1A投与する。
症状が改善したら1段階速度を落として投与再開する。

別表) Zolbetuximab+mFOLFOX6療法 ビロイ調製・投与速度表

ビロイ点滴濃度換算表 (初回: 800mg/m²) 2時間以上かけて投与

体表面積(m ²)	ビロイ投与量(mg)	点滴液量(mL)	投与速度(mL/h)				ビロイ投与時間(h)
			0-60分 100mg/m ² /h	60-120分 200mg/m ² /h	120-180 300mg/m ² /h	180分- 400mg/m ² /h	
1.0	800	400	50	100	150	200	約3.5
1.1	880	440					
1.2	960	480	65	130	195	260	
1.3	1040	520					
1.4	1120	560	80	160	240	320	
1.5	1200	600					
1.6	1280	640	95	190	285	380	
1.7	1360	680					
1.8	1440	720					
1.9	1520	760					
2.0	1600	800					

ビロイ点滴濃度換算表 (2回目以降: 400mg/m²) 2時間以上かけて投与

体表面積(m ²)	ビロイ投与量(mg)	点滴液量(mL)	投与速度(mL/h)			ビロイ投与時間(h)	②から開始した場合のビロイ投与時間(h)
			①0-60分 50mg/m ² /h	②60-120分 100mg/m ² /h	③120分- 200mg/m ² /h		
1.0	400	200	25	50	100	約3.2	約2.5
1.1	440	220					
1.2	480	240	33	65	130		
1.3	520	260					
1.4	560	280	40	80	160		
1.5	600	300					
1.6	640	320	48	95	190		
1.7	680	340					
1.8	720	360					
1.9	760	380					
2.0	800	400					

※初回嘔気・嘔吐がなければ②から開始可